

El Estréptococo B

¿Qué Es?

Es una bacteria normal que se encuentra con frecuencia en los intestinos, el recto, la vejiga, y la vagina del 15-40% de las mujeres embarazadas. Un adulto que tiene esta bacteria puede no tener síntomas de infección. Tener la bacteria de estreptococo B usualmente no causa daño a la salud de la mujer. Pero la bacteria puede causar daño a los recién nacidos si hay contacto durante la labor ó el parto.

Efectos en el Bebé:

Si el estreptococo B a pasado al recién nacido, el bebé puede desarrollar una infección. Esto ocurre solo en algunos bebés. Los bebés que llegan a infectarse pueden tener infecciones de los pulmones, de la sangre, cerebro o cordón espinal. Los medicos pueden dar tratamiento con antibióticos y otras medicinas a los bebés para sanarse.

La Prueba del Estréptococo B:

Se hace prueba de cultivos en las embarazadas a las 34-37 semanas del embarazo. Una muestra se toma de la vagina y otra muestra del recto con un algodoncito. A veces podemos encontrar la bacteria en muestras de orina.

Tratamiento del la Prueba Positiva:

Si la prueba es positiva y se encuentra la bacteria, vamos a recomendar que se reciba antibióticos por suero durante su parto para proteger su bebé de la infección. Si tiene un parto rapido y no hay tiempo para recibir antibióticos, los pediatras haran algunas pruebas se sangre a su bebé para ver si hay chances de infección.

Los bebés de alto riesgo de tener problemas con la bacteria son las bebés que:

- Φ nazcan antes de 37 semanas del embarazo
- Φ de una madre con ruptura prolongada de la fuente (más de 18 horas)
- Φ de una madre que ha tenido otros niños con infección de estreptococo B

En estos casos van a recibir antibióticos durante la labor de parto. Tratamiento durante el labor normalmente puede prevenir infección en el bebé.